
y
1
x
−1
1
−1


y
1
(x, y)?
$r = 1$
$\theta = 30°$
x
−1
1
−1

In a 30-60-90 triangle, the side opposite the 30° angle is half the hypotenuse



The Pythagorean Theorem tells us that the length of this side is


1
$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$
$r = 1$
$y = \frac{1}{2}$
$\theta = 30°$
x
$x = \frac{\sqrt{3}}{2}$


y
1
$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$
$r = 1$
$\theta = 30°$
x
−1
1
−1


y
1
(x, y)?
$r = 1$
$\theta = 45°$
x
−1
1
−1

$$x = y$$

$$x^2 + y^2 = 1$$

$$x^2 + x^2 = 1$$

$$2x^2 = 1$$

$$x = y = \frac{\sqrt{2}}{2}$$




y
1
$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
$r = 1$
$\theta = 45°$
x
−1
1
−1


$\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
(x, y)?
y
1
$r = 1$
$\theta = 60°$
x
−1
1
−1


$((x, y))$?
1
$r = 1$
$\theta = 90°$
x
−1
1
−1


y
$(x, y)?$
1
$r = 1$
$\theta = 120°$
x
−1
1
−1

Note that 60° is the reference angle so we use the same values as we would for 60° except we need to take into account the quadrant

$\sin 60° =$

$\cos 60° =$

$\sin 120° =$

$\cos 120° =$




$\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
(x, y)?
y
1
$r = 1$
$\theta = 120°$
x
−1
1
−1

Notice how the trig functions of 60° and 120° are related



Use a reference angle to find the trig functions for 135°



Use a reference angle to find the trig functions for 135°



	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
θ^{rad}	0^{rad}	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin\theta$	$\frac{\sqrt{0}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{0}}{2}$
$\cos\theta$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{0}}{2}$	$-\frac{\sqrt{1}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{4}}{2}$



(1, 0)

	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
θ^{rad}	0^{rad}	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin\theta$	$\frac{\sqrt{0}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{0}}{2}$
$\cos\theta$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{0}}{2}$	$-\frac{\sqrt{1}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{4}}{2}$



	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
θ^{rad}	0^{rad}	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π
$\sin\theta$	$\frac{\sqrt{0}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{0}}{2}$
$\cos\theta$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{0}}{2}$	$-\frac{\sqrt{1}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{4}}{2}$
$\tan\theta$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	*undefined*	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

$$\tan 30° = \frac{y}{x} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$ which can also be written as $\frac{\sqrt{3}}{3}$ but is not required

$$\tan 45° = \frac{y}{x} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1$$